



**SECRETARIAAT
FYSISCHE GENEESKUNDE**

Campus St.-Ursula

T. 013 55 08 07

Fysisch geneesheren

- > Dr. Sofie Peeters
- > Dr. Veronik Slachmuylders
- > Dr. Joyce Steenberghe
- > Dr. Maaiken Vander Plaetse

BOTULINETOXINE A: BEHANDELING VAN SPASTICITEIT NA CVA



OMSCHRIJVING

Na een CVA (beroerte) ziet men vaak spasticiteit optreden. Hierdoor ontstaan strak gespannen, stijve spieren en onwillekeurige samentrekkingen (spasmen).

Dit kan pijnlijk zijn; op termijn kan dit ook leiden tot het verkorten van de spieren. Dit kan vervolgens problemen geven bij wassen en kleden, hygiëne van de handpalm, ...

Indien een behandeling met medicatie of ortheses niet meer voldoet, kan worden overwogen om over te gaan op Botulinetoxine A behandelingen. Uw arts bepaalt in overleg met u de indicatie hiertoe.

Het gewenste behandeldoel zal tezamen met u worden overlopen op de raadpleging.

TERUGBETALING

Voorlopig is er enkel een gedeeltelijke terugbetaling bij patiënten met spasticiteit van het bovenste lidmaat, en dit drie tot twaalf maanden na een CVA (indien onvoldoende beterschap met kinesitherapie).

WERKING

- > De behandeling heeft een lokale werking;
- > Botuline toxine blokkeert de prikkeloverdracht van de zenuwen naar de spieren; hierdoor gaan de behandelde spieren ontspannen.
- > Het effect zal u na enkele dagen tot weken voelen; na een termijn van een 3-tal maanden is het product uitgewerkt. Nadien wordt geëvalueerd of en wanneer een volgende behandeling zinvol is.

VOORBEREIDING

- > Normaal gezien is er geen specifieke voorbereiding noodzakelijk
- > Indien u bloedverdunners neemt: bepaalde bloedverdunners moeten tijdelijk worden onderbroken; indien dit zo is in uw geval, wordt dit op voorhand besproken
- > De behandeling wordt uitgevoerd op de raadpleging.



VERLOOP VAN DE BEHANDELING

Uw arts zal bepalen welke spieren behandeld moeten worden; vervolgens zal door middel van EMG (elektromyografie) de gewenste spier gelokaliseerd worden en met een inspuiting zal de medicatie op de juiste plaats ingebracht worden.

Meerdere injecties zijn nodig op verschillende plaatsen in de te behandelen spieren.



MOGELIJKE NEVENEFFECTEN

Bijwerkingen kunnen optreden in de eerste week na de injectie en zijn van voorbijgaande aard.

- > Lokale blauwe plek en/of drukgevoeligheid op de injectieplaats .
- > ZEER ZELDEN EN tijdelijk: spierzwakte, griepachtige symptomen.